

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百五十三

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣朱炳

謄錄監生臣伍士鵬

欽定四庫全書

普濟方卷三百五十三

明

周王朱橐撰

產後諸疾門

虛汗

附論

夫虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是為陰氣虛也氣為陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故多汗也因之

遇風則變為瘕縱不成瘕則虛乏短氣身體柴瘦唇口
乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

方

牡蠣散

出聖惠方

治體虛汗出心煩食少四肢羸弱

牡蠣

一兩

龍骨

一兩

黃耆

一兩

白朮

當歸

剉微炒

桂心

芎藭

熟乾地黃

五味子

各半兩

人參

三分去蘆頭

白茯苓

三分

甘草

一分炙

微赤剉

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六

分去滓不拘時溫服

隱居羊肉湯

出肘後方

治虛汗乏氣不欲飲食氣血卒結顛

倒悶亂

羊肉

三斤

芎藭

一斤

甘草

炙一兩

芍藥

二兩

當歸

二兩

生薑

五兩

右以水一斗五升煮肉取九升去肉內諸藥煮取三升分溫三服大効一方云大補虛損有黃耆三兩人

參二兩

甘草湯

治產後血虛汗出不止

甘草

炙三分

當歸

切焙

人參

各一兩

芎藭

一兩

桂

去粗皮三分

芍藥

一兩半

生乾地黃

焙四兩

羊肉

一斤

去脂切碎水四大碗煮取汁三碗去油澄清

右除肉外粗搗篩每服三錢匕肉汁一盞煎至七分

去滓溫服不拘時

黃芪湯

出便產須知

治產後汗出血虛為風邪所搗若兩手

拭不及者不可治或產後汗不止因陰虛而得又遇

風邪發為此疾一方有甘草一名延壽湯

黃芪 白朮 防風 熟地黃 牡蠣粉 白茯苓

麥門冬

各等分

右呖咀每服四錢水一盞半紅棗二箇煎大半盞服

茯苓湯 治產後虛汗不止心悸恍惚怵惕多驚

白茯苓

去黑皮一兩半

甘草

炙黃一兩

芍藥

剉炒一兩

桂

去粗皮一兩

麥門冬

去心焙一兩

當歸

切炒一兩

黃耆

剉半兩

右搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分切棗二枚

擘煎至八分去滓服不拘時

黃耆飲子

出聖惠方

治產後體虛瘦四肢少力不思飲食心

神虛煩汗出口乾

黃耆

剉

人參

去蘆

生乾地黃

五味子

麥門冬

去心

當歸

各一兩

牡蠣

一兩半

燒為粉

右細剉和勻每服半兩水一大盞入薤白五莖豉五十粒煎至五分去滓不拘時分溫二服

麻黃根散

出聖惠方

治產後虛汗不止此陰血裏虛陽氣表

實陽加於陰陰虛不復者汗出不止遇風則變為瘰或虛乏羸瘦唇口乾燥經水斷絕津液竭也

當歸

黃耆

麻黃根

牡蠣

蝦為粉

人參

粉草

右各等分咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服一方加小麥二合

芍藥湯

治產後虛汗不止虛煩憤悶

芍藥

剉炒

當歸

切炒

生乾地黃

焙二兩

黃耆

剉一兩

石斛

去根

白茯苓

去黑皮

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

日三

麻黃根湯 治產後虛汗不止

麻黃根

二兩

牡蠣

燒黑一兩半

黃耆

剉一兩

人參

一兩

龍骨

一兩

枸杞根皮

二兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞半棗二枚擘破同煎至一盞去滓溫服不計時候

白朮散

出聖惠方

治產後體虛汗出四肢乏力腹內疼痛不

思飲食

白朮

龍骨

當歸

剉微炒以上各三分

生乾地黄

黃耆

剉

牡蠣粉

各一兩

右為散每服四錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六

分不拘時溫服

當歸散

出聖惠方

治產後惡露少汗出多虛無力

當歸

剉微炒

白芍藥

木通

熟乾地黄

牡蠣粉

蒼朮

剉微炒各二兩

右為散每服四錢水一中盞生薑半分去滓不拘時

溫服

附子湯 治產後榮血虛損汗出日夕不止形體困怠

附子

炮裂去皮
臍半兩

桂

去粗皮
二兩

生乾地黄

焙三分

芍藥

一兩

甘草

炙令黃
一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚

煎七分去滓溫服不計時

石斛湯 治產後虛熱汗出不止

石斛

去根
附子
炮裂去皮臍切

白朮

剉炒

秦朮

去苗
土

桂

去粗皮
各一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞小麥五十粒同煎

至七分去滓服不拘時

療產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸

出永

類
方

甘草

炙一兩

附子

半箇炮梨去皮臍

桂心

芍藥

各一兩半

右呶咀每服三錢水一盞生薑四片棗一枚煎至七分去滓空心服忌猪肉冷水生葱等物

地髓湯 治產後亡陰血虛汗出不止

生地黃

焙

芍藥

當歸

切焙

芎藭

各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服

日三

人參散 治產後虛汗不止煩熱體痛渴燥引飲

人參

芍藥

剉

甘草

炙

龍膽

各一兩

右為散每服二錢 麝香溫酒調服日三

又方

出聖惠方

治產後虛汗不止

當歸

黃耆

各一兩

麻黃根

二兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

撲肌散 治汗不止

黑附子

二錢半 炮

牡蠣

半兩 鹽 洗 煨

糯米

一兩 炒

右為末以絹袋盛身上撲之

止汗散

出永類 鈴方

治產後盜汗不止凡多汗者皆可服

牡蠣

煨 細 研

小麥麴

炒 令 黃色

右等分研細煮生豬肉汁調下二錢無時服

人參湯

出永類 鈴方

治產後諸虛不足發熱盜汗

人參

去 蘆

川當歸

去 頭 尾

右等分為末以豬腰子一雙去脂膜切小片子以水

三升糯米半合蔥白兩條煮米熟取清汁一盞入藥

二錢煎至八分溫服不拘時

牡蠣散

出聖惠方

治產後虛汗不止膝理虛踈

牡蠣

一斤燒研如粉

麻黃根

四兩

右搗羅麻黃根為細末同牡蠣粉拌勻粉汗

龍骨散

出聖惠方

治產後虛汗不止

龍骨

一斤

麻黃根

一斤

右為散每服二錢不拘時以粥飲下

吳茱萸散

出聖惠方

治產後體虛汗出心煩食少四肢羸弱

喜熱惡寒

吳茱萸

半兩湯浸
七遍微炒

五味子

一兩

右搗篩酒二大盞浸半日煎至一盞三分去滓不拘

時分溫三服

療產後血氣暴虛汗出

用淡竹葉湯三合微溫服之須臾再服一方用淡

竹瀝

又方

出便產須知

治產後血痢小便不通臍腹痛刺

用馬齒莧研取汁三大合如無乾者亦可煮一沸投蜜一匙令停頓服

葦草汁方 治汗出正赤汚衣名曰汗血皆由大喜傷心喜則氣發血隨氣行婦人產蓐多有此證及膏淋尿血

以葦草不拘多少搗取汁二升醋二合空腹服一

蓋或濃煮汁飲亦治淋瀝尿血

桂枝附子湯

出千金方

治產後虛風汗出不止小便難四肢

微急難以屈伸者

桂枝

三兩

芍藥

三兩

生薑

三兩

甘草

一兩半

附子

一枚

大棗

十二枚

右㕮咀以水七升煎取三升分為三服

佛手散

出大全良方

治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽

有痰

當歸

一兩

川芎

一兩

黃耆

一兩

北柴胡

一兩

前胡

一兩

右咬咀每服三錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅各一枚薑三片煎至六分去滓溫服如有痰去烏梅

又方

出聖惠方

治產後虛汗不止

牡蠣粉

一人兩

人參

去蘆頭一兩

當歸

剉微炒一兩

白芍藥

一兩

麻黃根

一兩

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

單方

出朱氏
集驗方

治產後虛汗

用防風不以多少麩炒赤色為末煎豬皮湯下

虛熱 附論

夫新產之後陰血虛弱失於將理則陽氣偏勝使陰陽不能平均身體煩悶唇口乾燥肢節倦痛是為產後虛熱

方

栢子仁丸

治產後虛熱羸瘦困倦補益

栢子仁

炒一兩

澤蘭葉

一兩

甘草

炙剉一兩

當歸

切焙一兩

芎藭

一兩

白朮

半兩

白芷

半兩

桂

去粗皮半兩

細辛

去苗葉半兩

防風

去蘆一兩

半

人參

牛膝

去苗浸切

酒

麥門冬

去心焙各一兩

生乾地黃

焙

石斛

去根各一兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙剉半兩

橐本

去苗土半兩

蕪荑

半兩

附子

炮裂去皮臍

乾薑

炮各一兩

右粗末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九溫酒或

米飲下不拘時候

柴胡湯

治產後虛熱久不解漸成勞氣

柴胡

去苗一兩

生乾地黄

焙一兩

附子

炮裂去皮臍一兩

當歸

切焙一兩

人參

一兩

芎藭

一兩

黃耆

一兩

芍藥

一兩

肉苁蓉

去粗皮切酒浸焙一兩

石斛

去根一兩

右剉如麻豆每服二錢匕水一盞入生薑三片棗一

枚擘同煎至七分去滓溫服不拘時候

芍藥湯

治產後虛熱骨節煩倦瘦瘁

芍藥

剉一兩

牡丹皮

一兩

人參

一兩

芎藭

一兩

乾薑

炮半兩

白茯苓

去黑皮一兩

甘草

炙一兩

白薇

一兩

麥門冬

去心焙一兩

熟乾地黄

焙一兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時候

地黄湯 治產後虛熱不解煩倦無力困瘁

熟乾地黄

焙一兩

附子

此裂去皮
時一兩

當歸

切焙
一兩

人參

三

柴胡

去苗三分
方用一兩

白茯苓

去黑皮
三分

芎藭

三分
芍藥

三分

肉苁蓉

切酒浸
焙一兩

黃耆

剉一兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時候

桂心湯 治產後虛熱狀似勞氣瘦瘁無力

桂

去粗皮
一兩

黃耆

剉一兩

芎藭

一兩
當歸

切焙
半兩

赤芍藥

剉一兩半

甘草

炙一兩

人參

一兩

附子

炮裂去皮
臍半兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片棗一枚

擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候

當歸湯 治產後血虛肢體壯熱煩悶困瘁不食

當歸

切焙一兩半

黃耆

剉一兩半

芍藥

一兩半

桂

去粗皮
一兩

芎藭

一兩

甘草

炙一兩

人參

一兩

柴胡

去苗葉一兩

右粗搗篩每服二錢匕羊肉汁一盞同煎至七分去

滓溫服不拘時候

香豉湯 治產後虛羸肌肉枯痺肢體虛弱

豉

半兩

豬腎

一隻去脂膜作四片

當歸

切焙半兩

蔥白

三莖切

人參

半兩

桂

去粗皮半兩

白粳米

淘一合

右將當歸人參桂麤搗篩每服三錢匕水三盞入豬

腎蔥白豉米煎取一盞半去滓空心日午臨卧溫服

芍藥湯

治產後虛熱煩悶瘕瘕

芍藥

一兩知母

半兩

甘草

炙一兩

桂

去粗皮一兩

黃芩

去黑皮一兩

人參

一兩

生乾地黃

焙三兩

黃耆

剉二兩

右龍搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時候

蜀漆湯

出千金方

治產後虛熱往來心胸中煩悶滿骨節疼

及頭痛壯熱晡時輒甚又似微瘧

蜨母

知母也二兩

芍藥

二兩

蜀漆葉

一兩

甘草

炙一兩

黃芩

一兩

桂心 一兩 生地黄 一斤 黃耆 五兩

右切以水一斗先煎地黄取七升去滓下諸藥煮取

二升半分三服湯療寒熱不損人忌如常法

芍藥湯

出千金方一名桂心牡蠣散

療產後虛熱頭痛身體發熱腹

中拘急疼痛

白芍藥

五兩

生乾地黄

五兩

黃芩

二兩

千金要方云若通身發熱方加黃芩

桂心

三兩 牡蠣 五兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服一

方治產後頭疼食後服腹痛食前服此方不傷損人無毒

八仙湯 治煩悶煩悶者虛熱也血氣有陰陽臟腑有虛實實則生熱虛則生寒常服溫補藥而積溫成熱致發煩渴名曰客熱經下少而煩熱血熱也煩滿短氣者虛熱也煩渴而嘔吐痰熱也妊娠煩燥者子煩也產後口乾煩渴心下悶痞者氣虛也煩悶之疾八仙湯主之

赤茯苓 麥門冬 知母 前胡 半夏麴

各二錢

右哎咀每服三錢水一盞入甘草三寸煎至七分空

心熱服

獨聖湯 治煩熱

麥門冬 烏梅

去核

右哎咀等分用水一碗煎至八分露一宿清晨服之

無憂散

出華陀中藏經方

治產後發熱

琥珀

一兩研

生地黄

半斤切

右將地黃於銀器中炒煙盡合地上出火毒乳鉢內
研為末每一兩琥珀末二錢和勻用童子小便與酒
中半調下一錢日三服

薤白湯

出朱氏
集驗方

治產後胸中煩熱逆氣

薤白

二兩

半夏

二兩

甘草

二兩

人參

二兩

桔樓根

一兩

麥門冬

半兩

右咬咀水一斗三升煮四升分五服熱甚加知母一兩

虛渴

附論

產後虛渴者血虛內亡津液故也血為陰陰虛則陽勝

勝則生熱虛熱熏蒸津液內涸咽乾口燥故令渴而引
飲也凡婦人產後一二日漸熱口乾可用新汲水調玉
燭散或水調甘露散服亦妙勿作虛寒治之 煩渴者

本起於腎虛而或飲之所發也膀胱為津液之腑宣行
陽氣上蒸於肺化水液滋潤五臟調養骨髓其次為肌
膚為血肉上為涕淚下為溲溺陽無陰而不降陰無陽
而不升陰陽阻隔氣血不交遂令發渴或耽嗜酒肉多
食辛辣好食熱麵恣性荒淫將養失理耗損津液好酒

虛氣積於肺熱氣聚於脾脾經受熱腎水乾枯故成渴
疾治之宜與獨聖湯主之

方

地黃當歸湯 治產後血虛煩渴飲食不進

熟乾地黃

焙

赤石脂

各二兩

當歸

切焙

朮占斯

地榆

黃連

去須

白茯苓

去黑皮各一兩

天雄

炮皮臍

黃耆

剉各一兩半

黃芩

去心半兩

桑耳

紫葛

剉

麻黃

去根節各一兩半

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片同煎

至八分去滓溫服

乾地黄湯

治產後下血過多虛煩熱渴

生乾地黄

焙三分

芍藥

一兩

芎藭

一兩

桔梗

炒三分

丹參

一兩

當歸

切微炒三分

乾薑

炮裂半兩

白茯苓

去黑皮一兩半

知母

焙半兩

人參

一兩

葛根

剉碎三分

甘草

炙半兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時

石斛丸

治產後虛渴或脫血過多臟腑虛渴骨節煩

熱倦怠

石斛

去根

牛膝

去苗酒浸切焙

澤瀉

附子

此裂去皮臍

桂

去粗皮

杜仲

去粗皮炒剉

山茱萸

山茱

肉蓯蓉

酒浸切焙

鹿茸

酥炙去毛

白茯苓

去黑皮

生乾地黄

微炒各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九煎棗湯下

不拘時候

黑神丹

出御藥院方

治婦人產後大發熱消渴不止煩躁不

休或汗病後胃脘停水者並宜服之

黑附子

炮裂去皮臍一兩

天麻

去蘆頭

天南星

炮裂去皮去粗

半夏

漿水煮焙乾

麻黃

去根節各一兩半

草烏頭

一兩炮裂去皮臍

乾薑

炮裂一兩半

白附子

炮黃色半兩

麝香

去毛細研一兩

天雄

二兩慢火上炙熱好酒內煎如此七遍無令折藥力更用童子小便內煎七遍搗一坑子納深五寸先用熱火坑內炙乾去火坑內灑酒半升入天雄在內用磁碗蓋定週迴沉固不教漏氣冷定取出之用之

右各修製訖一處碾為細末煉和搜成劑約搗千餘杵丸如梧桐子大發熱渴用蜜水化服欲出汗熱酒

化服汗病後胃脘硬停水依前用蜜水化服一九

竹葉湯

出千金方

治產後虛渴少氣力

竹葉

三升

生薑

三兩

半夏

三兩

大棗

十四枚

小麥

五合

茯苓

一兩

人參

一兩

甘草

一兩

麥門冬

五兩

右咬咀以水九升煮竹葉小麥生薑棗取七升去滓

內諸藥更煎取二升半一服五合日三夜一

葛根飲 治產後虛煩熱渴

葛根

剉一兩

人參

一兩

白茯苓

去黑皮半兩

桂

去粗皮一兩

芍藥

半兩

甘草

炙半兩

檳榔

二枚剉

麥門冬

去心焙半兩

赤芍藥

半兩

右為粗末每服三錢 水一觔煎七分去滓溫服不

拘時候

黃耆湯 治產後氣血虛乏內燥引飲心下煩悶

黃耆

微炙剉三分

白茯苓

去黑皮

當歸

切微炒

桑寄生

微炙各半兩

陳麴

微炒半兩

桃仁

湯浸去皮尖雙人麴炒黃三分

乾薑

炮裂半兩

桔梗

炒半兩

右為粗末每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時候

回津丸

出便產
須知

治產後虛渴去血多津液少腎氣虛飲

無度當養血通氣回津補腎則安

白芍藥

錢一

白朮

錢二

澤瀉

錢一

茯苓

錢一

川芎

錢一

當歸

錢二

五味子

錢三

烏梅肉

錢一

右為末煉蜜丸服或嚼或熟水吞下二三十丸可加

甘草二錢訶子肉一錢

又方

出干
金方

治產後渴不止

括蓼根

四兩

人參

三兩

麥門冬

三兩

甘草

崔氏
不用

乾地黄

各二兩

大棗

二十枚

土瓜根

五兩崔氏用蘆根

右咬咀以水一斗二升煮取六升分六服一方無地

黃麥門冬有牡蠣粉等分

蘆根飲

出永類鈴方

療產後大渴不止

蘆根

切一升

括蕒

三人參三兩

甘草

三兩

茯苓

三兩

大棗

二十枚

麥門冬

生四兩

右以水九升煮取三升分三服頓服四劑即瘥忌松

菜一方無大棗

竹葉湯 治產後虛渴

竹葉

一兩切

甘草

炙半兩

人參

半兩

小麥

一兩

白茯苓

去黑皮半兩

半夏

薑汁製一分

麥門冬

去心焙二兩

右搗粗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

延胡散

出濟生拔粹方

治產後血渴不止

延胡索 鬱金 乾葛 桂心 青皮 枳殼

製等分

右等分並以好醋浸一宿焙乾杵為細末每服一錢

冷橘皮湯調下不過三服即瘥

麥門冬人參湯 治產後虛渴引飲

麥門冬

去心 焙

人參

甘草

炙

括萎根

生乾地黄

焙

王瓜根

各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食

後溫服

熟地黄散

出危氏方一名地黃湯

治產後虛渴不止少力脚弱眼

暗頭眩飲食無味

熟乾地黄

一兩

人參

三兩

麥門冬

二兩

括萎根

四兩

甘草

半兩

右判散每服四錢水二盞糯米一撮生薑三片棗子

三箇煎至七分去滓食前服一方無棗煎

菖蒲散 治產後津液減耗虛渴引飲

石菖蒲

一兩

括萎根

一兩

黃連

去鬚半兩

右為散每服二錢匕新汲水調下日三

薑米湯 治產後虛乏津液衰耗燥渴不止

乾薑

炮一兩

陳粟米

炒二兩

甘草

炙一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食前
稍熱服日三

又方 治產後血渴甚者

紅花子 人參 乾葛

右等分為末每服三錢水一盞半淡竹葉一把同煎
至一盞去滓放溫時時呷之如無紅花子以乾胭脂
代之

地黃散 治產後血虛煩熱引飲不止

生乾地黄

焙一兩

熟乾地黄

焙四兩

右為散每服三錢匕溫酒調下溫粥飲調亦得日三

黃芩散 治產後血渴飲水不止

黃芩 麥門冬

右等分咬咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫

服不拘時

治婦人產後口乾舌縮渴不止

用雞子一箇打煎水一盞衝之揉蓋少時服

治產後渴

用蜜不以多少煉過熟水溫調服即止

治產婦渴疾神効

用縮砂皮不拘多少煎湯百沸候通口飲之不過

一盞渴疾自止

治產後血渴不止

用蒲黃羅細每服二錢溫米飲調下不渴住服

療產後血渴疾

用生蓮子心為末以米飲調下三錢服之立愈

見睨丸 治產後口乾痞悶此證蓋因產後榮衛大虛
血氣未定食麪太早胃不能消化麪食之毒結聚於
胃脘上熏胸中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識
認為胸膈壅滯以藥下之萬不一應服見睨丸則愈
或云未必只因食麪產母內積憂煩外傷燥熱飲食
甘辛亦令口乾痞悶當隨其所因調之可也宜四物
湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱看屬何經當

隨經為治又恐是乳欲行氣血弱使然

薑黃 三稜 華澄茄 陳皮 良薑 人參

莢茂

各等分

右為細末用蘿蔔湯煮爛研將汁煮麪糊為丸如
梧桐子大用蘿蔔湯下三十九丸或子煎湯下治食麪
早胃不能化 評曰傷食可用見睨丸若煩心所致
不宜用

四物湯

當歸 人參 芍藥 川芎

等分

烏梅煎如別傷燥熱當察所因調之為善

心虛驚悸

附論

夫產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經為風邪所乘也或恐懼憂迫令心氣受風邪風邪傳於心則驚不自安若驚不已則悸動不安其狀目睛不轉而不能呼診其脉動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸矣

方

治產後臟腑虛心怔驚悸言語錯亂

一名牛黃散

麥門冬

人參

各八錢

牛黃

研

白薇

各二錢

茯神 獨活

天竺黃

遠志

生地黄

一作熟地黃

朱砂

飛

防風

甘草

龍齒

研各四錢

龍腦

麝香

並細研各一錢

右為末用薄荷酒調下二錢

大遠志丸

治產後心虛不足心下驚悸志意不安恍

恍惚腹中拘急痛夜卧不安胸中吸吸少氣內補

傷損益氣安定心神亦治虛損

遠志 甘草 乾地黃 桂心 茯苓 麥門冬

人參 當歸 白朮 澤瀉 獨活 菖蒲

各三兩

薯蕷

阿膠

各二兩

乾薑

四兩

右為末蜜和丸如大豆未食溫酒服二十九日三不知稍增至五十丸若大虛身體冷少津液加鍾乳三兩為善

遠志丸 治產後臟虛心神驚悸志意不安腹中急痛

遠志

去心

黃耆

剉

白茯苓

桂心

麥門冬

去心

獨活

焙

獨活

人參

去蘆頭

當歸

剉微炒

白朮

鍾乳粉

阿膠

搗碎炒

阿膠

全黃燥

阿膠

各一

阿膠

栢子仁

菖蒲

熟乾地黃

薯蕷

各一

薯蕷

兩

薯蕷

薯蕷

薯蕷

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大不拘時

候溫酒下二十九

丹砂丸

出聖惠方

治產後風虛心神驚悸或時煩悶志意不

定

丹砂

一兩

水飛過

龍齒

三分

鐵精

三分

金薄

十一片

金薄

細研

金薄

細研

牛黃

一分
細研

麝香

一分
細研

栝子仁

半兩

菖蒲

半兩

遠志

半兩
去心

琥珀

半兩
細研

人參

三分
去
麋頭

茯苓

半兩

生乾地黃

三分

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三百杵丸如梧
桐子大每服二十九不拘時以金銀湯下

芍藥湯

治產後血氣虛弱心下驚悸夢寐不安妄見

鬼物

方見本門
虛羸類計二味

白茯苓散

出聖惠方一名
熟乾地黃散

治產後心神驚悸不定語言

失常心中憤憤

白茯苓

一兩半

熟乾地黄

一兩半

遠志

一兩去心

白芍藥

一兩

麥門冬

一兩

甘草

一兩

黃耆

一兩

桂心

一兩

當歸

一兩

人參

一兩

菖蒲

三錢

桑寄生

三錢

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚竹葉三七片煎至七分去滓無時服

茯苓散 治產後臟虛心中驚悸志意不安言語錯亂不自覺知

茯苓 遠志 人參 麥門冬 桂心 白芍藥

生地黃

一方作熟地黃

當歸

龍齒

羚羊角

各等分

右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至六分去滓溫服不拘時

龍齒散

出聖惠方一名熟地黃散

治產後心虛驚悸神思不安

龍齒

黃耆

白薇

生地黃

各一兩

人參

茯神

遠志

羌活

甘草

桂心

防風

各半兩

右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至六分去滓無時服一方無黃耆有荊芥半兩一方用熟

地黃

療產後心氣虛損卒驚狂語或歌哭嗔笑性氣不定

出永

方類
針

上等銀一升桂心六分甘草六分細辛四分人參八分薑八分

遠志八分茯神八分生地黃二分龍骨三分棗子一枝

右咬咀以水八升煮銀至一升半入藥煎至一升分

作三服溫進

白羊心湯

出聖
惠方

治產後內虛心神驚悸志意不定皆為

風邪所攻

白羊心

一枚細切以水六中
煎取三盞去心

熟乾地黄

分三

白芍藥

牡蠣

鵝碎炒
今微貴

防風

去蘆
頭

人參

去蘆
頭

遠志

去心

黃耆

剉

獨活

茯苓

甘草

炙微赤剉
各半兩

右為散每服三錢以羊心汁一中盞煎至六分去滓

不拘時溫服日三

茯苓散

療產後心虛驚悸志意不定煩躁恍惚

茯苓

當歸

黃芩

麥門冬

甘草

酸棗仁

人參 芍藥

白鮮皮

各三兩

大棗

七枚

右為粗末以水二升煮取七合去滓溫服

達志湯

出千金方

治產後忽若心中衝悸不定志意不安言

語錯誤惚惚憤憤情不自覺

達志 麥門冬 人參 甘草 當歸 桂心

各二兩

芍藥

一兩

茯苓

五兩

生薑

六兩

大棗

二十枚

右為末以蜜漿膏和丸三升去滓分服日三服者分

四服產後得此正是心虛所致無當歸用芍藥若其

人心胸逆氣加半夏三兩

甘草湯

出千金方

治產後心虛不足驚悸心神不安吸吸乏氣

或若恍恍惚惚不自知覺者

甘草

遠志

菖蒲

各三兩

人參

麥門冬

乾薑

茯苓

各二兩

澤瀉

桂心

各一兩

大棗

五十枚

右為末蜜丸如大豆酒服二十九日四五服夜再服

不知稍加若無澤瀉以白朮代之若胸中冷增乾薑

人參丸

出千金方

治產後大虛心悸志意不定不自覺恍惚

恐懼夜不得眠虛煩少氣

人參 甘草

茯苓

各三兩

麥門冬

菖蒲

澤瀉

薯蕷

乾薑

各一兩

桂心

一兩

大棗

五十枚

右為末以蜜棗膏和丸如梧桐子大未食酒服二十
九日三夜一不知稍增若有遠志肉二兩為善若風
氣內當歸獨活三兩亦治男子虛損心悸

龍齒散 治產後臟氣虛心神驚悸不自覺知語言錯
誤志意不定

龍齒

遠志

人參

去蘆頭

熟乾地黄

甘草

剉微赤

茯苓

當歸

剉微炒

白芍藥

麥門冬

去心焙

牡蠣

燒為粉各一兩

右為散每服三錢水一中盞入艾葉三七片生薑半

分棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服

羊心湯 治產後血氣驚悸神志不寧

羊心

一枚以水五盞煎取三盞汁用

甘草

炙一兩

遠志

去心半兩

芍藥

剉

防風

去叉半兩

生乾地黄

焙一兩半

牡蠣

熬各一兩

羚羊角

銹屑半兩

人參

一兩半

右將八味麤搗篩每服三錢匕水煮羊心汁一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

茯神湯 治產後忽若心中衝悸或志意不定恍恍惚惚言語錯謬心虛所致

茯神

四兩

人參

三兩

茯苓

三兩

芍藥

二兩

甘草

二兩

當歸

二兩

桂心

二兩

生薑

八兩

大棗

三十枚

右呖咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三良

人參散

出聖惠方

治產後臟虛心忪驚悸語言錯亂

人參

去蘆頭

茯神

麥門冬

去心焙

羚羊角屑

黃芩

犀角屑

龍齒

各一兩

白蘚皮

半兩

甘草

半兩炙微赤剉

右搗篩每服二錢匕水一中盞煎至六分去滓入竹

瀝半合更煎一兩沸不拘時候溫服

達志湯 治產後心虛驚悸夢寐不安

達志

去心

龍腦

人參

茯神

桂皮

去粗

芍藥

剉

黃耆

剉

麥門冬

去心焙

各半兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫服不

拘時候

茯苓湯

出千金方

治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍恍惚

惚心中憤憤此皆心虛所致

茯苓

五兩一方用三兩

甘草

二兩一方用一兩

芍藥

二兩

桂心

二兩一方用一兩

當歸

二兩一方用一兩

生薑

六兩一方用六兩

麥門冬

一升

大棗

三十枚

右呖咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三無當

歸用芎藭若苦心志不定加人參亦可肉遠志二兩

若苦煩悶短氣加生竹葉一斤先以水一斗三升煮

竹葉取一斗內藥若有微風加獨活三兩麻黃二兩
桂心二兩用水一斗五升若頸及脊背膊强者加獨
活葛根各三兩麻黃桂心各二兩生薑八兩用水一
斗五升

安心湯

出千金方

治產後心衝悸不定恍惚惚不自知覺

言語錯誤虛煩短氣志意不定此是心虛所致

遠志

二兩

甘草

二兩

人參

茯神

當歸

芍藥

各三兩

麥門冬

一升

大棗

三十枚

右咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三若苦
虛煩短氣者加淡竹葉二升水一斗二升煮竹葉取
一斗內藥若胸中少氣者益甘草三兩為善

產乳七寶散

出永類
銓方

療初產後服之調和血氣補虛安

神壓驚悸

辰砂 桂心 當歸 川芎 人參 白茯苓

羚羊角

燒存性已
上各二錢 乾薑 一錢 產科
各等分

右為末每服三錢用羌活豆淋酒下將護產婦用之

如不飲酒用清米飲調下如覺心煩熱悶以麥門冬
去心煎水調下若心下煩悶而痛用童子小便調下
若覺心胸煩熱即減薑桂冷即加之腹痛加當歸心
悶加羚羊角心虛氣怯加桂心不下食或惡心加人
參虛顫加茯苓以意斟酌日二夜一服

人參湯 治產後驚悸不安

人參

一兩

遠志

去心
半兩

白茯苓

去黑皮
二兩

麥門冬

去心
焙

芍藥

剉各
半兩
當歸

切桂

去粗皮
各一兩

右粗搗篩每服二錢匕生薑三片棗一枚擘破水一

盞煎至七分去滓通口服不拘時候

琥珀散

出聖惠方

治產後心氣不足驚悸不安言語不定錯

亂不眠

琥珀

研

人參

半兩

白茯苓

去黑皮一兩

遠志

去心半兩

甘草

炙一分

熟乾地黄

焙用半兩

鉛粉

研半兩

右先以五味搗羅為散再入研者藥研勻每服二錢

煎金銀湯調放溫服空心日午臨卧各一

茯神湯 治產後虛驚心氣不安

茯神

去木
二兩

人參

一兩
半

白茯苓

去黑皮
一兩半

芍藥

剉

甘草

剉

當歸

切
焙

桂

去粗皮
各一兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時候

白茯苓丸

出聖
惠方

治產後心虛驚悸神不安定

白茯苓

一兩

熟乾地黃

一兩

琥珀

兩

桂心

人參

去蘆
頭

遠志

去心

菖蒲

栢子仁

各半
兩

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大不拘時候以粥飲下三十丸

人參湯 治產後虛驚心神恍惚

人參

剉一兩

麥門冬

去心半兩

木通

剉

芍藥

各二兩

甘草

炙一兩

羚羊角

銹屑一分

右粗搗篩每用水三盞先煮羊肉三兩取汁一盞去肉入藥末三錢已再煎至七分去滓溫服不拘時候琥珀地黃丸 治產後驚悸亂道言語如見鬼狀精神

不定者研好硃砂酒調下局方龍虎丹三九作一服

煎服此藥

南番琥珀

別研

延胡索

糯米同炒赤去米

當歸

各一兩

蒲黃

炒香四兩

生薑

洗研梨汁留滓以生薑汁於銀石器內炒地黃滓地黃汁炒生薑滓各至乾堪為末則止

生地黃

各二斤研梨汁留滓

右為末煉蜜丸如彈子大食前當歸湯化一九服

麥門冬湯

治產後心虛驚悸恍惚不安

麥門冬

去心焙半兩

熟乾地黃

焙一兩

白茯苓

去黑皮

甘草

炙剉

芍藥

判各
一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片棗一枚
擘破煎至七分去滓溫服不拘時候

療心虛多驚及產後敗血諸疾

出永類
鈴方

辰砂

琥珀

沒藥

並細
研

當歸

各等
分

右為末每服三錢空心日午臨卧白湯調服

治產後血邪安心止驚悸

用自然銅以酒磨服之

傷寒 附論

夫人觸冒寒氣而為病者謂之傷寒產婦血氣俱虛日月未滿而起早勞動為寒所傷則淅淅惡寒翕翕發熱頭顙肩背骨節皆痛至七八日乃瘥也 凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之比等疾證多是血虛或敗血作梗血虛者陰虛也陰虛者陽必湊之故發熱且以平和之劑與服必効如玉露散或四物湯以生地黃易熟地黃加北柴胡等分煎服或人參當歸散秦艽

驚甲散人參輕骨散人參百解散逍遙散皆可選用多
見不學無聞纔見產後發熱不退便以為熱入血室便
以小柴胡湯竟不可救者亦有用竹葉石膏湯而死者
亦有見前失而投以溫劑其熱愈熾者諸如此等非不
知罪福皆是不觀古典杜撰臆度枉傷人命殊不知此
等病狀是產後去血過多而陰虛發熱亦有寒極生熱
但以上件之藥以脈證選用無不獲安若是陰陽不和
乍寒乍熱宜增損四物湯如敗血不散者宜奪命丹大

調經散五積散加醋煎却効王子亨云婦人新產去血過多津液燥少陰陽俱虛大凡有疾如中風傷寒時氣之類雖當發熱汗如麻黃證不可取汗母令過多以意

斟酌

直指方云產婦傷寒論云或問婦人傷寒可得聞乎曰傷寒三百九十七條一百十有三方此張氏

誠然之筆削也於某證則見有某藥曷嘗以男女為別哉要之月事去來產前產後男子所無請發明其蘊以解世俗之惑蓋婦人以血為主發熱惡寒經水適來經日熱除而胸滿譏語者是則邪氣結於胸脇當刺期門隨其竇而取之傷風經日續生寒熱發作似瘧而經水適斷者是則血結而不行當以小柴胡湯散之所謂治之而愈者此也至如傷寒發熱經水適來晝醒暮譫如見怪狀是則裏無留邪熱隨血散所謂不治自愈者此

也前于吐血下血兩條併以犀角地黃湯桃仁承氣湯抵當湯丸之類言之詳矣抑產前產後治法將何擇焉曰產前安胎產後消瘀於是遵依條例斟酌輕重而調理之安胎者何桑寄生阿膠縮砂為要藥他如桂枝半夏桃仁大黃墮胎及燥熱等輩則不可輕用也消瘀者何川芎蒲黃赤芍藥生地黃為要藥他如內補攔住敗血之劑則不可輕進也朱氏以阿膠桑寄生人參茯苓白朮等而細末糯米飲調劑為孕婦安胎以紅花一分官桂芍藥甘草半之薑棗同煎為解表消瘀以蔥白生薑大劑濃汁為產前發散以小柴胡湯去半夏和解熱入子宮邪稽中以枳殼防風一分甘草減半末之煎服主大便秘澀又蜜導一法真可活人然則產婦證治觀此可以問津索塗矣雖然知安胎則不可不調氣知消瘀則不可不扶虛枳殼香附陳皮以調氣也當歸川芎黃耆人參以扶虛也退熱則柴胡黃芩解肌則紫蘇乾葛滋腸則麻人枳殼助陽則乾薑良薑其間採摭雖未

備古人之理然而甘辛為陽酸苦為陰皆不越古人之意婦人產後亡血過多故令鬱冒其脉微嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以謂產婦忌汗出者亡陰血陽氣獨盛故當汗出陰虛不復所以便堅而嘔不能食也方可用小柴胡湯加生乾地黃主之

方

人參湯 治產後傷寒頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼
寒壅欬嗽鼻塞聲重

人參 赤茯苓

去黑皮

當歸

切炒

前胡

去蘆頭

羌活

去蘆頭

芎藭

判

白朮

柴胡

去苗

枳殼

去穢炒

桔梗

甘草

炙

獨活

去蘆頭

各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片薄荷五葉

煎至七分去滓溫服不拘時候

前胡散

出聖惠方

治產後傷寒頭目疼痛四肢煩熱心胸滿

悶不欲食飲

前胡

三分去蘆頭

石膏

二兩

麻黃

一兩去根節

葛根

判

人參

去蘆頭

黃芩

芎藭

枳實

麩炒微黃

赤芍藥

甘草

炙微赤判

半夏

湯洗七遍去滑

桂心

已上各半兩

右為散每服四錢以水一中入生薑半分豉五十粒

蔥白五寸煎至六分去滓稍熱頻服以微汗為効

半夏散

出聖惠方

治產後傷寒欬嗽咽喉不利四肢煩疼

半夏

湯洗七遍去滑

人參

去蘆頭

桔梗

去蘆頭

赤芍藥

細辛

白朮

桂心

陳橘皮

湯浸去白穰焙

甘草

炙微赤剉已上各半兩

前胡

去蘆頭半兩

麻黃

一兩去根節

杏仁

三分湯浸去皮尖雙入麩炒微黃

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分

去滓不拘時候溫服

桂心散

出聖惠方

治產後傷寒頭目四肢俱疼心胸煩熱

桂心

一兩

石膏

二兩

麻黃

去根節三分

荆芥

三分

赤芍藥

三分

葛根

三分

柴胡

一分去苗

芎藭

半兩

人參

去蘆頭半兩

細辛

去苗半兩

甘草

一分炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服如人行五七里再服以得汗出為度

桂枝湯 治產後傷寒頭目昏痛體熱煩悶夫產後血

氣俱弱邪氣易襲藏於膚腠之間與正氣相搏則令
頭痛體疼發熱惡寒是為產後傷寒之證汗下之方
比常用之宜輕不可一槩也

桂枝

去粗皮

麻黃

去根節煎掠去沫焙

前胡

去蘆頭

芍藥

柴胡

去苗

人參

當歸

切炒

甘草

炙

芎藭

石膏

各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚煎
至七分去滓溫服不拘時候

前胡湯 治產後傷寒發熱頭疼體痛欬嗽痰壅

前胡 麻黃 柴胡 人參 桔梗 芍藥

細辛 枳殼 甘草 半夏

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大切煎至七分去滓溫服不拘時候

麻黃散

出聖惠方

治產後傷寒三日已前頭項腰脊俱痛發

汗不出煩躁者

麻黃

一兩去根節

桂心

三分

杏仁

半兩湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

白朮

三分

人參

三分去蘆頭

厚朴

三分去粗皮塗生薑汁炙令香熱

甘草

半兩炙微赤剉

乾薑

半兩此梨

芎藭

三分

附子

三分此梨去皮臍

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎

至五分去滓稍熱服以衣覆取微汗如人行五七里

未汗即再服

前胡散

出聖惠方

治產後傷寒欬嗽心胸不利背煩疼

前胡

三分去蘆頭

杏仁

半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒黃

桂心

半兩細辛兩

人參

三兩去蘆頭

麻黃

三分去根節

赤茯苓

三分

甘草

一分炙微赤剉

白朮三分赤芍藥半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服不拘時候

小柴胡加生地黃湯出濟生
板料方治產後往來寒熱而脉弦

者少陽也

柴胡二兩黃芩七錢半人參五錢半夏一兩半甘草七錢半

大棗三枚生地黃 梔子 枳殼各五錢

右剉細每服一兩水煎服

葛根散

出聖惠方

治產後傷寒三日前頭疼惡風寒熱

葛根

一兩剉

麻黃

一兩去根節

桂心

三分剉

甘草

三分剉

赤芍藥

三分

柴胡

一兩去苗

石膏

一兩

厚朴

一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熱

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓稍熱服之如人行五七里再服以微汗為度

白朮散

出聖惠方

治產後傷寒四肢拘急心腹滿悶頭痛壯

熱

白朮

芍藥

赤芍藥

附子

炮裂去皮臍

桂心

各三分

青橘皮

湯浸去白
鹽焙三分

厚朴

一兩去粗皮塗生
薑汁炙令香熟

石膏

一兩半

甘草

一分炙
微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分不計時候去滓稍熱服

石膏湯 治產後傷寒時行溫熱惡風頭痛體痛鼻

咽乾心膈煩滿寒熱往來欬嗽痰壅

石膏

二分

黃芩

去黑心
一兩半

前胡

去蘆頭
二兩半

葛根

二兩半

升麻

桑根白皮

剉

荊芥穗

各一兩半

赤芍藥

柴胡

去苗各
二兩半

右粗搗每服三錢 水一盞生薑三片豉十粒同煎
至七分去滓溫服不拘時候

羚羊角飲 治產後傷寒壯熱胸膈煩悶渴燥

羚羊角屑 前胡去蘆頭 人參 桂去粗皮 大腹皮剉

芍藥 蘆根洗剉 甘草炙 當歸切焙各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚煎
至七分去滓溫服不拘時候

柴胡當歸湯 治產後傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰

陽俱虛不可汗下此宜主之

柴胡

三兩

白朮

二兩

人參

甘草

炒

川當歸

芍藥

五味子

木通

各一兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑四片棗二枚煎至七分去滓服不拘時候日進二三服

荊芥湯

治產後傷寒頭目昏痛欬嗽痰壅肢節疼痛

荊芥穗

麻黃

去根節煎掠去沫焙

乾薑

炮

五味子

石膏

甘草

炙

人參

芍藥

各一兩

右粗搗篩每服三錢 水一盞煎至七分去滓溫服
不拘時候

麻黃湯 治產後傷寒欬嗽痰壅氣短

麻黃

去根節煎掠去沫焙

前胡

去蘆頭

白前

甘草

炙

貝母

去心

桑根白皮

剉

杏仁

去皮尖雙入麩炒

當歸

切炒各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片葱白三寸

煎至七分去滓溫服

細辛散

出聖惠方

治產後傷寒虛煩頭疼四肢骨節俱疼

細辛

半兩

桂心

一兩

赤芍藥

三分

前胡

一兩

去蘆頭

石膏

二兩

葛根

三兩

黃芩

半兩

甘草

半兩

炙

微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分葱白五

寸豉五十粒煎至六分去滓不計時候溫服以微汗

為度

梔子散

出聖惠方

治產後傷寒煩熱不解大小便澀

梔子仁

半兩

犀角屑

三分

赤芍藥

三分

黃芩

半兩

柴胡

一兩

去苗

川大黃

一兩

微炒剉

甘草

半兩

炙

木通

一兩

剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候去滓溫服

人參散

出聖惠方

治產後傷寒胸膈痰壅嘔逆四肢煩熱

人參

一兩去蘆頭

丁香

半兩

前胡

一兩去蘆頭

半夏

半兩湯洗七遍去滑

甘草

半兩炙微赤剉

桂心

半兩

訶黎勒皮

三分

厚朴

一兩去粗皮塗生薑

汁更令

香熟

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎三枚煎至六分去滓不計時候溫服

療產後感風傷寒欬嗽多痰唾粘

甘草

六分

苦梗

六分

欬冬花

四分

生麥門冬

生地黃

各十分

葱白

一握

豉

二合

舊名方

無葱白與豉

右呖咀水二升煮取八合去滓食後分二服

芍藥湯

治產後傷寒肢體疼痛乾嘔頭昏煩躁潮熱

赤芍藥

葛根

各一兩判

麻黃

甘草

石膏

人參

當歸

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘

時候溫服

竹葉湯 治產後傷寒煩躁迷悶熱渴頭痛

淡竹葉

半兩切

人參

芍藥

黃芩

麥門冬

去心焙

石膏

甘草

炙各一兩

右粗搗篩每服三錢 水一盞生薑三片棗二枚煎

至七分去滓溫服不拘時候

枇杷葉散

出聖惠方

治產後傷寒嘔噦不止虛煩渴燥

枇杷葉

半兩去毛微炙

麥門冬

去心三分

厚朴

半兩去粗皮塗生薑汁炙令黃熟

葛根

三分判

陳橘皮

湯浸去白穢

人參

去蘆頭各三分

甘草

半兩炙微赤判

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓溫服不拘時

麥門冬散

出聖惠方

治產後傷寒頭痛身體如火心胸煩躁

麥門冬

一兩去心

赤芍藥

黃芩

梔子仁

犀角屑

各三分

石膏

二兩

甘草

半兩炙微赤判

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白五

寸豉五十粒煎至六分去滓稍熱頻服微汗出為度

羚羊角湯

出肘後方

治產後時行兼邪氣似瘧者

羚羊角

鱉甲

炙各六分

知母

甘草

炙各二兩

香豉

五合

牡蠣

一兩

右以水五升煮取一升八合去滓分五服近用殊有

効

小柴胡湯

治產後傷寒時氣發熱惡風頸項強急胸

滿脇痛嘔逆煩渴寒熱往來大小便不利或骨肉煩熱

傷寒過經不解或差後勞復百節疼痛

柴胡

去苗
四兩

黃芩

去黑
心

人參

甘草

炙

半夏

湯浸去滑
各二兩半

右粗搗篩每服三錢匕水一中半入生薑五片棗二

枚煎至八分去滓溫服不拘時候

射干散

出聖
惠方

治產後傷寒經數日後胸中煩悶咽喉噎

塞不能飲食

射干

半兩

川升麻

三人分

人參

三分
去蘆頭

陳橘皮

三分

湯浸
去白

穰焙

甘草

半兩
炙

微赤判

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

羌活散

出聖惠方

治產後傷寒心膈煩躁肩背強硬四肢拘

急煩疼

羌活

三分

石膏

一斤

麻黃

一斤

兩節

甘草

一分

炙

赤茯苓

微赤剉

桂心

芎藭

赤芍藥

葛根

白朮

黃芩

細辛

已上各半兩

右件藥搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白五寸豉五十粒煎至六分去滓稍熱服微汗

出為度

桂藥散

出衛生家寶方

治產後如傷寒候寒熱不調心驚頭昏

體虛四肢無力飲食全不思產中所犯並宜服

沒藥

一分研

官桂

半兩

當歸

三分生用

右為末每服一大錢炒葱白酒下日三服

三物黃芩湯

大全良方

治婦人草薺中風傷寒四肢苦煩熱

頭痛與柴胡湯後頭不疼但煩者

方見本門前產後諸疾類千金三物

黃芩湯

陽旦湯

大全良方

治婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡

寒時時有熱心下堅乾嘔汗出

桂枝

芍藥

各三兩

甘草

炙

黃芩

各二兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分

去滓溫服無時候自汗者去桂加炮熟附子一枚渴

者去桂加栝樓根三兩下利者去芍藥加乾薑三兩

心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦

湯主之煎時入膠飴為佳若脉浮緊無汗發熱者莫

與也

普濟方卷三百五十三

欽定四庫全書

普濟方卷三百五十四

明

周王朱橚

撰

產後諸疾門

寒熱

附論

產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散能令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產傷勞臟腑血弱不得宣通故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人

若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別之時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減 乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散宜止入脾肺二臟邪大抵一陰一陽閉即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再會而復作大調經散五積散入醋煎佳

方

紅藍花散

出聖惠方

治產後寒熱頭痛手足疼惡露不快心

腹刺痛

紅藍花

一兩

甘菊花

當歸

剉微炒

蓬莪茂

赤芍藥

鬼箭羽

芎藭

桂心

已上各一兩

牛膝

去苗

劉寄奴

赤茯苓

桃仁

湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

羚羊角屑

已上各三分

生薑

半分

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘

時候溫服

黃耆散

出聖惠方

治產後乍寒乍熱骨節疼痛四肢無力面

色痿黃

黃耆

一兩剉

附子

三分剉去皮臍

鬼箭羽

半兩

鱉甲

一兩塗醋炙微黃去裙襴

芎藭

半兩

當歸

三分剉微炒

赤芍藥

三分

牡丹

半兩

牛膝

三分去苗

桂心

半兩

桃仁

三分湯浸去皮尖雙人麤炒微黃

赤茯苓

三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不拘時候溫服

療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生瘡時時
乾嘔困乏悶絕

人參 獨活 白鮮皮 葛根 防風 青竹茹

遠志

各六分

茯苓

八分

白欬

十分

元參

十二分

竹瀝

二升半

右銀一升水一斗五升煎取七升下諸藥重煎取三
升分三溫服忌魚酒麵等物

豬腎湯

出聖惠方

治產後體虛寒熱發渴四肢少力心神煩

悶不思飲食

豬腎

一對去脂膜切作四片

敗生薑

半兩拍碎

白粳米

半兩

人參

半兩去蘆頭

黃耆

半兩剉

當歸

一兩

葱白

三根切

右細剉以水二大盞煎至一盞去滓食前分為三服

赤芍藥散

出聖惠方

治產後敗血不散乍寒乍熱骨節煩痛

唇口乾焦心胸悶亂

赤芍藥 人參

去蘆頭

防風

去蘆頭

當歸

剉

生乾地黄

紅藍花

藕節

已上各一兩

羚羊角

三分

芍藥

三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分黑豆五

十粒煎至六分去滓不拘時候溫服

增損四物湯

大全良方

治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡

露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

人參

一兩

當歸

一兩

芍藥

一兩

乾薑

一兩

甘草

右㕮咀每服四錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

熱服無時候一方無甘草有乾地黃一方云大抵一

陰一陽閉即作寒熱陽勝故熱陰勝故寒只可云敗

血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣

解則休遇再會而復作大調經散五積散入醋煎佳

石膏散

出聖惠方

治產後寒熱頭痛

石膏

二兩

黃芩

一兩半

桂心

一兩半

生乾地黃

一兩半 牡蠣二兩 燒過

赤芍藥

二兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘

時候溫服

蓬莪散

出聖惠方

治產後惡血滯留增寒壯熱心腹疼痛

蓬莪散

一兩半

當歸

一兩半 剉

蒲黃

三分

桂心

三分

川大黃

一兩半 剉 微炒

桃仁

一兩湯浸去皮尖
雙人麩炒微黃

右為散不計時候以煖酒調下二錢

治產後乍寒乍熱通身溫壯心胸煩悶

出肘
後方

知母 生乾地黄 劉寄奴 鬼箭羽 羌活

當歸

剉微炒已
上各三分

柴胡

一兩
去苗

鱉甲

一兩塗醋炙
微黃去裙襖

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑
半分煎至六分去滓不計時候溫服

芎藭散

出聖
惠方

治產後敗血不散體虛乍寒乍熱骨節疼

痛四肢少力

芎藭

芍藥

黃芩

各二兩

桂心

一兩

甘草

二兩炙

右以水六升煮取二升分三服比於蔣家得此方無

桂加生地黃一升

知母散

出聖惠方

治產後壯熱增寒四肢少力不思飲食

知母

當歸

剉微炒

鬼箭羽

劉寄奴

白朮

已上各二兩

桃仁

一兩半湯浸去皮尖雙入麩炒微黃

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水酒各半盞煎至

六分去滓不計時候溫服

療產後寒熱心悶極脹及百病

出肘後方

以羚羊角燒末用酒服方寸匕未差再服

療產後寒熱心悶極脹及百病

以馬通絞取汁一盞以酒和服之瘥

瘧疾 附論

產後血氣未至和平邪氣客於風府循膂而下與衛氣大會陰陽交爭虛實更作寒熱相移其始發也起於毫

毛伸欠及作寒慄頭額腰脊俱痛去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲是寒熱瘧之證也瘧證曰并於陽則陽勝并陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱 凡產後病瘧而作寒熱有一日一發或一日二三發或間一日一發或三兩日一發或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或但寒但熱者亦有產前病瘧而產後未愈者最難用藥如柴胡常山信砒等斷不可用今有經草果飲子生熟飲子用之有效如易簡方四獸飲亦可用

方

秦朮湯

治產後瘧先寒後熱頭痛發渴骨節痛

秦朮

去苗土

麻黃

去根節煎掠去沫焙

烏梅

去核炒

常山

甘草

炙

麥門冬

去心炒

青蒿子

柴胡

大黃

炮

鱉甲

醋炙去裙襴

當歸

切焙

赤茯苓

去黑皮各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至八

分去滓當未發前服欲發時再服

草果飲子

出危氏方

治婦人產後瘧疾寒熱相半者或多熱

者

半夏

炮

赤茯苓

甘草

炙

草果

炮去

川芎

陳皮

白芷

各二錢

青皮

去白

良薑

紫蘇

各一錢

乾葛

四錢

右咬咀每服三錢以水一大盞薑三片棗二枚同煎

至七分去滓當發日候早連進三服無有不安

犀角飲

治產後寒熱瘧往來不歇

犀角屑

麥門冬

去心焙

升麻

洗焙

知母

切

生乾地黃

焙

當歸

切焙

甘草

炙

鱉甲

醋炙去襖

石膏

打碎

柴胡

去苗各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓當
未發前服欲發時再服

木香丸 治產後一切瘡

木香

常山

剉牡蠣

火燒赤

大黃

剉知母

焙烏梅

去核炒

鱉甲

醋炙去裙襖

當歸

切焙各一兩

丹砂

別研半兩

麻黃

去根節煎掠去沫焙

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下

當未發時服

芍藥飲 治產後寒熱瘧頭疼體痛煩渴

赤芍藥

一兩

黃芩

去黑心
一兩

柴胡

去苗
一兩

麥門冬

去心焙
一兩半

當歸

切焙
二兩

白茯苓

去黑皮
一兩半

鱉甲

去裙襴醋
炙二兩

常山

三分

白朮

剉三分

甘草

炙半兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚

煎至八分去滓溫服當未發前不拘時候

人參飲 治產後寒熱往來不已煩渴體痛

人參

甘草

炙

厚朴

去粗皮薑汁
炙各三分

知母

半兩

常山

半兩

麥門冬

去心焙

柴胡

去苗

豬苓

去黑皮

白茯苓

去黑皮
各二兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至半
中去滓當未發前服

生熟飲子

出危氏方

治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻 草果仁 半夏 陳皮 甘草 生薑

厚朴

生去粗皮

大棗

去核

右各等分細剉和勻一半用濕皮紙煨令香熟去紙
與一半生者和勻每服秤五錢重水二盞煎至七分
食前一服食後一服

烏梅飲 治產後寒熱瘧發渴頭痛

烏梅肉

炒

黃連

去

柴胡

去

人參

各一

當歸

切焙

一兩半

甘草

炙三

常山

半

生乾地黃

焙

三

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚

煎至八分去滓當未發前溫服

知母飲 治產後寒熱瘧發或半月間日發

知母

半

白茯苓

去黑皮

烏梅肉

剉三

麥門冬

去心焙

一兩

大青

半

柴胡

去苗

甘草

炙三

當歸

切焙

一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚煎至八分去滓當未發前服欲發時再服

柴胡湯 治產後諸瘧寒熱往來煩渴

柴胡

去苗

黃芩

去黑心

人參

當歸

切焙

生乾地黄

焙

甘草

炙

豬苓

去黑皮各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓當未發前及空心日午臨卧服

七勝飲 治產後寒熱瘧煩渴引飲頭疼體痛

乾薑

半兩
炮

黃連

去
翳

桃仁

去皮尖
雙入炒

當歸

切
焙

常山

剉

柴胡

去
苗

豬苓

去黑皮
各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓當未

發前空心溫服欲發時再服

常山飲 治產後寒熱瘧

常山

一兩

甘草

一兩

黃芩

去黑
心熬

石膏

碎各
二兩

烏梅

去核用
十四枚

當歸

切焙
二兩

芍藥

一兩
半

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚

煎至八分去滓當未發前溫服

小柴胡湯

治產後寒熱瘧

方見本門
傷寒類

大黃散

治婦人天行瘡病因產後心下痞悶氣逆潮

熱小便澀秘不通者

大黃

陳皮

黑牽牛

各一
兩炒

右為末每服一二錢清茶調下若加半兩木香名大

通散

無憂散

出衛生
家寶方

治產後瘧疾

用蘿蔔子

不以多少炒

右一味為末每服二錢米飲調下只一服立愈

治產後腎勞如瘕者

如婦人體熱用豬腎體冷用狗腎燒灰酒服之

大小便秘澀

附論

內經謂大腸與膀胱受五臟濁氣名曰傳化之府此不能久留輸瀉者也婦人大小腸本挾熱者既產之後血氣暴竭津液內涸燥熱相搏大小腸秘澀不能傳導故

大小便俱不通也

方

三脫散 治產後臟腑壅滯腸胃燥澀大小便秘兼治

腳氣

大腹皮

炙剉

紫蘇莖葉

沉香

木山

切焙

獨活

去蘆頭

各一兩

檳榔

麩栗煨熟去麩

白朮

芎藭

木香

陳橘皮

去白焙

甘草

炙剉各三分

右為粗散每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服

不拘時候一方有菴活

檳榔散

出聖惠方

治產後大小便秘心腹脹滿氣促

檳榔

一兩

車前子

三分

冬瓜仁

三分

川大黃

一兩

木通

一兩

桂心

半兩

甘草

半兩

當歸

半兩

川朴硝

一兩

滑石

一兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時候

溫服

柴胡湯

治產後內熱大小便不通

柴胡

去苗

黃芩

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白切焙

澤瀉

石膏

碎

鈴羊角

銹各三分

梔子仁

一兩

赤茯苓

去黑皮一兩

芒硝

別研各一兩半

右粗搗篩八味每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓下芒硝末半錢匕更煎一沸溫服

榆白皮散

出聖惠方

治產後大小便秘澀小腹疼痛

榆白皮

三分剉

木通

一兩剉

黃芩

半兩

當歸

三分剉

葵子

半兩

川大黃

一兩剉炒

赤芍藥

半兩

滑石

一兩

蒲黃

半兩

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓

不計時溫服

茯苓丸 治產後大小便不通

赤茯苓

去黑皮

赤芍藥

當歸

切

人參

枳殼

去穢炒

白朮

剉炒

大麻仁

別研如膏各半兩

大黃

剉炒三兩

右搗羅七味為末與麻仁研勻煉蜜和丸如梧桐子

大每服二十九煎茅根湯送下以利為度

梔子仁湯 治產後大小便不通

梔子仁

石膏

碎

黃芩

圓小者

柴胡

去苗

赤芍藥

剉

澤瀉

萋薢

各一兩半

車前葉

切半升

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前
溫服以利為度

櫛榔散 治產後大小便不通臍下疼痛魚腹滿急脹

櫛榔

剉半兩

桂

去粗皮半兩

芎藭

半兩

獨活

去蘆頭半兩

木香

半兩

大黃

剉炒

郁李仁

去皮尖雙人別研

赤茯苓

去黑皮各一兩

右為散每服二錢匕食前溫水調下以利為度

木通飲 治產後大小便秘澀

木通

剉炒三兩

冬葵根

剉三兩

黃芩

去黑心

甘草

炙剉

當歸

切焙

蒲黃

微炒

陳橘皮

湯浸去白焙

瞿麥穗

各半兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫

服日再

桃仁散

出聖惠方

治產後大小便秘澀心腹脹滿時時拘作

疼痛

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙人研

葵子

一兩

川大黃

一兩剉炒

甜瓜子

一兩

青橘皮

一兩湯浸去白焙

檳榔

當歸

一兩剉炒

甘草

半兩剉炒

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時溫服

木通散

出聖惠方

治產後大小便不通

木通 大麻仁 葵子 滑石 檳榔 枳實

甘草

各半兩

右為粗末每服三大錢水一盞半煎至七分去滓溫服

赤芍藥丸 治產後風虛壅結大小便不通

赤芍藥

一兩一分桂去粗皮

瞿麥

取穗三分

大黃

剉炒半兩

檳榔

剉

當歸 羌活

切焙去蘆頭各二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲下以利為度

木香丸 治產後因腫滿小腹急脹大小便不通

木香

一兩 炮

牽牛子

二兩 炒別 搗為末

防已

陳橘皮

去白炒 各半兩

訶梨勒

炮去核

羚羊角

鑄

檳榔

剉各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎生薑橘皮湯下以利為度

石韋湯 治產後大小便不通臍下妨悶兼痛

石韋

去毛

赤芍藥

各一兩

當歸

二兩剉炒

冬葵子

二合炒

大黃

半兩生剉

瞿麥

取穗一兩半

赤茯苓

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

以利為度

大黃丸 治產後關格閉塞大小便不通

大黃

二兩剉炒

芒硝

一兩別研

黃芩

去黑心

赤芍藥

赤茯苓

去黑皮

杏仁

去皮尖雙人麤炒

生乾地黄

焙各一兩半

右為末煉蜜和搗丸如梧桐子大每服二十九食前

煎粟米飲下以利為度

療產後大小便不利下血

一名蒲黃散
出便產須知

車前子

黃芩

蒲黃

牡蠣

芍藥

各六分

生地黃

半兩

右為細末空心米飲服方寸匕忌麪蒜

芍藥湯 治產後大小便不通腹脹急氣

赤芍藥

芒硝

別研

杏仁

去皮尖雙人
麤炒各一兩

大麻仁

三分研
如膏

大黃

剉炒
當歸
三兩
切炒各

右將四味麤搗篩入大麻仁同研令勻每服三錢

水一盞半煎至八分去滓下芒硝半錢匕溫服以利

為度

當歸散

出聖惠方

治產後大小便秘澀

當歸

二兩剉炒

黃芩

一兩剉

紫葛

一兩剉

白茅根

三分剉

川朴硝

二兩

甘草

半兩炙剉

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓

不計時溫服

牽牛子丸

出聖惠方

治產後大小便秘澀腹脹疼痛

牽牛子

大麻仁

當歸

剉炒

川大黃

剉炒

木通

剉各一兩

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙人麤炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時粥飲下三十丸以利為度

榆白皮湯

治產後大小便不通

榆白皮

剉碎四兩

桂

去麤皮

當歸

剉炒

甘草

炙剉

滑石

各一兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

以利為度

木香丸 治產後胸膈噎塞心下痞堅行滯氣消飲食

通利大小便

木香 牽牛子

二十四兩炒香別
搗服末十二兩

華澄茄 補骨脂 炒

檳榔

酸漿米飯裹濕紙
煨熟去飯各四兩

右搗四味為末與牽牛末和勻漸滴井華水和丸如

菜豆大每服四十九茶清熟水食後任下

麻仁丸

出紀
氏方

治產後大便秘澀者何咎曰產後水血俱

下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若五
六日腹中悶脹者此有燥糞在臟腑以其乾澀未能
出耳宜津潤之若誤以為有熱而投以寒藥則陽
消陰長變證百出性命危矣

麻仁 枳殼 人參 大黃

各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二十丸未
通漸加不可太過 評曰產後不得利利者百無一
生去血過多臟燥大便秘澀故當滑之大黃似難

輕用唯葱涎調臘茶為丸復葱茶下之必通常以局
方四物湯以生地黄湯易熟地黄加青皮去白前服
効或用阿膠枳殼等分為末滑石衣熱水下二十九
半日未通再作郭以大黄治秘澀陳非之陳乃以大
黄芒硝治血暈所見不同如此二藥皆難輕試

療產後津液燥竭大小便不通

出永類
餘方

芍藥 大黄 枳殼 麻仁

各等
分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心熱水下二十九

一方有甘草山梔仁

療產後勞傷熱大小便秘澀

雞蘇

一分

通草

十分

冬葵子

三合

芍藥

八分

滑石

八分

芒硝

八分

生地黃

十二分

右水三升煮取八合下芒硝空心分三服

桃花散 治產後大小便秘澀

桃花 葵子 滑石 檳榔

右各等分為細末每服二錢葱白湯空心調下

芫花丸

出聖惠方

治產後大小便秘澀坐卧不安

芫花

半兩醋炙乾

滑石

一兩

川大黃

一兩剉炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九葱白湯

下

療產後血滲入小腸大腸

出永類鈴方

車前子汁

一大升蜜合

右相和煎一沸分為二服

葱膠湯 治產後大小便不通

葱白

握一

牛膠

一片

廣二

寸長四寸

右剉碎以水三升和煮消盡去滓頓服

木香煮散 治產後冷熱不調大小便不通

木香

炮為末

青黛

研各一兩

右再研令勻每服二錢匕水半盞麻油少許同煎十餘沸和滓溫服少頃即通

濡臍湯 治產後大小便不通六七日腹中有燥屎寒

熱煩悶氣短汗出腹脹滿

生葛根

五兩切無生者用乾葛一兩

大黃

半兩剉炒

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

以利為度

又方

出便產須知

治產後大小便秘澀此是津液少不可服

通利藥宜潤其腸若通利之則必至腸滑不禁不可

治

以麻仁粥每用半盞搗仁取水煮粥服之

治產後大小便不通並服瀉藥腹脹氣喘方

用青鹽半斤炒令變色先以漿水一斗半煎沸下鹽末在湯中攪和傾盆中看冷熱通手即入盆中坐浸腰腹須臾便通湯或漸冷即入新熱湯投之常令稍熱人困即扶起少頃又浸

又方

出聖惠方

用羊蹄根一兩水一大盞煎至六分去滓為二服食前服之

又方

出聖惠方

用桃花三兩為末每服二錢新汲水調下

枳殼丸

出衛生寶鑑

治產後大小便澀滯

枳殼

一兩麩炒

大黃

一兩

木香

三錢

麻仁

炒黃一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前溫水送下如飲食不化亦得服之

麥蘖散

出大全良方

療產後五七日不大便切不宜妄服藥

先宜用之

大麥蘖

不以多少

右炒黃為末每服三錢沸湯調下與粥間服

大便不通

附論

大腸者傳道之官變化出焉產後津液減耗胃中枯燥
潤養不足糟粕壅滯故大便難而或不通凡新產之人
善病此者由去血多內亡津液故也 產後水血俱下

腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六
日腹中悶脹者此有燥屎在臟腑以其乾澀未能出
耳宜服麻仁九津潤之若誤以為有熱而投以寒藥則

陽消陰長變證百出性命危矣

方

調胃散 治產後大便秘澀不通

大黃

剉炒

當歸

切焙

麥門冬

去心焙

桃仁

去皮去雙人麩炒

菖蒲

剉

鱉甲

醋炙去裙襴

生乾地黃

焙

柴胡

去苗各一兩

黃連

去鬚三分

桂

去粗皮半兩

厚朴

去粗皮三分生薑汁炙透

吳茱萸

湯浸去涎焙乾炒半兩

秦艽

去苗土三分

右為散每服二錢匕溫水調下空心食前服

三腕湯

一名三腕散

治產後大小便不通

方見本門大便秘澀類

治產後大小便不利

出余居士選奇方

大黃

芍藥

麻黃

各六分

枳殼

五分

甘草

三分

山梔

二分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服米飲吞下三十丸

十聖丸 治產後大便不通秘澀臍腹堅痛

檳榔

剉

木香

芎藭

羌活

去蘆頭

桂

去粗皮各一兩

大黃

剉蒸

郁李仁

去皮尖別研如膏

當歸

切

人參

熟乾地黄

焙各二兩

右除郁李仁外搗羅為末入郁李仁和勻煉蜜為丸
如梧桐子大每服二十九米飲下不拘時以利為度
又方 治產後熱燥大便秘澀

升麻

枳實

去穢
麩炒

黃芩

去黑心
各三分

生乾地黃

焙

人參

當歸

大黃

剉

梔子仁

杏仁

去皮尖雙
人麩炒

甘草

炙各
一兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓食前
服

大腹皮湯

治產後熱毒氣結燥大便不通壅滯氣悶

疼痛腰重脇脹

大腹皮

五枚細剉

枳殼

去穢麩炒

赤芍藥

剉各一兩

天門冬

去心焙乾三分

秦艽

去黑皮半兩

甘草

焙一兩

羌活

去蘆頭半兩

郁李仁

去皮炒半兩

生乾地黄

焙一兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

得利為度

大黃丸 治產後大便秘澀不通

大黃

剉炒 當歸

切焙

赤芍藥

厚朴

去麤皮生薑汁炙透各一兩

枳殼

去穰
炒

大麻仁

別研
如膏

生乾地黄

焙各
三分

右搗羅六味為末與麻仁膏同研令勻煉蜜和丸如
梧桐子大每服二十九米飲下不拘時服

訶梨勒丸

治產後大便秘澀不通

訶梨勒

煨去
核

大黃

剉
炒

當歸

切
焙

熟乾地黄

焙

人參

大麻仁

別研如膏
各一兩半

右搗羅五味為末與大麻仁同研令勻煉蜜和丸如
梧桐子大每服三十九米飲下不拘時服

厚朴九 治產後大腸虛結秘澀不通

厚朴

去麤皮生薑汁炙透一兩

人參

一兩

陳橘皮

去白焙一兩

大黃

剉一兩

郁李仁

去皮別研如膏一兩

當歸

切焙一兩半

右搗羅五味為末入郁李仁膏同研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下不拘時

升麻湯 治產後大便秘澀

升麻 大黃

剉各一兩

當歸

切焙二兩

山梔子仁

微炒二兩

前胡

去蘆頭二兩半

生地黃

焙三兩

右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食
前溫服

人參丸 治產後大便不通

人參

檳榔

剉各一兩半

當歸

切焙一兩

厚朴

去麤皮生薑汁炙透三分

郁李仁

去雙人皮尖研如膏半兩

右搗羅四味為末入郁李仁膏同研令勻煉蜜和丸
如梧桐子大每服二十九溫水下加至三十丸不拘
時

產後大便不通皂莢內藥方

豬牙皂莢

生

杏仁

湯去皮
共雙仁

蛇蛻皮

微炒

乾薑

蛇各

蜜

半兩

右先搗四味細羅為末於銚子內熬蜜三兩沸後下

藥末不住手攪候可丸即丸如棗核大每服一九用

綿子裹藥以麻油潤藥上內下部中仰卧便通未通

再內

大黃丸 治產後風熱大便秘澀

大黃

剉

大麻仁

研如膏

當歸

切焙各三分

生乾地黃

焙四兩

右搗羅三味為末與麻仁膏同研勻煉蜜和丸如梧
桐子大每服十九米飲下以利為度

郁李仁飲 治產後腸胃燥熱大便秘澀

郁李仁

別研
如膏

朴硝

別研
細

當歸 生乾地黄

右將二味麤搗篩與別研者二味和勻每服三錢
水一盞煎至七分去滓溫服未通便服

治產後大便不通大腸結燥腹中壅脹內藥方

皂莢

不蛀者一挺去皮
子酥炙搗為末

鹽豉

半合
研細

白蜜

一合

右先熬蜜令消次下鹽豉皂莢末慢火煎不住手攪
候如飴即丸如棗核大內一九入下部中未通可內
三五丸不妨藥在內自化如得通利即隨出

中和散 治大便不通不問老幼皆可服

附子

一兩一半
生一半炒

大黃

一兩一半
生一半炒

右同碾為散每服二錢匕溫米飲調下臨卧服

治產後大腸熱燥糟粕結艱藥勢不入大便不通宜以

皂莢導方

以皂莢肥不蛀者去皮子一挺為末煉蜜和丸如棗大取一九內下部中須臾即通

治產後下部閉塞大便秘結不通以烏梅導方

用烏梅十四枚溫湯浸取肉搗丸如小櫛櫛大每服用一枚內下部中立通

溫中丸 治產後大便不通七八日以上者

以硫黃用柳木細研飛過生用用水浸吹餅和丸如梧桐子大每服二十九或三十九用木香少許

煎湯吞下即効

麻蘇粥

出永類
鈴方

治婦人產後有三種疾鬱冒而多汗則

大便秘澀故難於用藥唯此粥能治之

紫蘇子 大麻子仁

右等分淨洗研令極細用水再研取汁一盞分二次
煮粥啜之此粥不惟產後大抵老人諸虛風秘皆得
用嘗有一貴人母年八十四忽爾腹滿頭痛惡心不
下食請醫者數人議皆作補脾進食治風清利頭目

數日病愈甚全不入食其家憂甚懇予辨之予曰前藥皆誤此疾正是老人風秘臟腑壅滯聚於膈中則腹脹惡心不喜食又上於巔則頭痛神不清也若得臟腑流暢諸疾悉去矣予令作此粥兩啜而氣泄先下結尿如故班者十餘後漸得通利不用藥而自愈

葱涎丸 治產後大便秘澀由產後水血俱下腸虛津液不足所致若過五六日腹中悶脹有燥糞宜潤其腸若以為熱投以寒涼之劑則陽消陰長性命危矣

麻仁

枳殼

各等分

右為末葱涎調臘茶為丸每服五七十九空心食前
葱茶下之必通

阿膠枳殼丸

出三方

治產後虛羸水血俱下腸胃虛竭津
液不足大便秘澀

阿膠

枳殼

右各等分煉蜜丸如梧桐子大別研滑石為衣溫水
下二十九半日以米未通再服

蜜免法 療產後熱結大便不通

以白蜜五合慢火煎令如硬飴以投冷水中良久取出捻如拇指大長二寸內穀道中即通

調導飲

出直指方

治婦人產前產後大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼

製各四錢

甘草

炙三錢

右細剉每服三錢水一盞薑棗煎食前服

小便不通

附論

產後氣血俱虛弱津液虛少將溫過度熱入膀胱氣脉

內燥壅塞不通始則淋瀝甚則不通令人小腹繞臍脹
痛氣滿於內亦令胎轉治法使氣得通則愈

方

髮灰湯 治產後小便不通

亂髮

燒灰

車前子

大黃

剉炒

桂

去麁皮

當歸

切焙

滑石

各一兩

冬瓜子

五合

木通

剉一兩半

右麁搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

日三夜一

榆白皮散 治產後小便秘澀小腹疼痛

榆白皮

剉

木通

剉

黃芩

去心

葵子

炒

滑石

別搗

研

芍藥

芍藥

炒

蒲黃

各三分

右搗研為散每服二錢匕濃煎木通湯調下

葵根湯 治產後小便不通

葵根

二兩洗剉

亂髮灰

半兩

大黃

去

桂

皮

滑石

木通

木通

當歸

剉

炒各

一兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服食

前日再

澤瀉散 治產後小便不通

澤瀉

剉二兩

井泉石

半兩研

車前子

洗焙乾

赤茯苓

去黑皮剉

當歸

切焙各一兩半

葶藶子

紙上炒

甘遂

生各半兩

右為散每服一錢匕蜜湯溫調下食前日再服

木通湯 治產後小便不通

木通

細剉

黃芩

去黑心

石葦

去毛各一兩

榆白皮

細研二兩

甘草

炙三分

白朮

炒用二兩

冬葵子

剉一兩半

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服
食前日二服

滑石湯 治產後小便不通煩悶

滑石

當歸

切焙

木通

剉各一兩

冬葵子

炒

黃芩

去黑心

麥門冬

去心焙各三分

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

空心食前

當歸湯

治產後小便秘澀小腹疼痛

當歸

切焙
一兩

白芷

剉微炒

紫葛

芎藭

各半
兩

白茅根

胡荽

各三分

右細剉每服五錢匕水一盞半入葱白五寸同煎至

八分去滓溫服食後夜卧

黃芩湯 治產後小便不通

黃芩

去黑心

瞿麥

取穗

當歸

切焙

冬葵子

炒

木通

剉各一兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服日

三

車前子湯 治產後小便不通

車前子

洗焙

瞿麥

取穗

當歸

切焙各一兩

黃芩

去黑心洗

鬱金

剉各半兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時日二

葵子湯 治產後小便不通

葵子炒石膏

生碎

滑石

各一兩

阿膠

炒令燥

貝齒

四枚

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

日三

治產後小便不利

用鼠婦七枚一味熬為膏作一服酒調下

鼠婦俗名溫生蟲

治產後小便不通

出余居士選奇方

蒲黃 芍藥

黃芩

牡蠣

車前子

各四分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三十丸空心服

療卒不得小便

用杏仁十四箇去皮尖炒為末和飲頓服立通

療脬轉小便不通八九日

滑石

十三分

寒水石

八分

右水二升煮取八合空心分三服

葱餅子

出余居士
選奇方

治產後婦人小便不通腹脹如鼓悶

亂不醒蓋緣未產之前內積冷氣遂至產時尿胞運動不順

用鹽於產婦臍中填與臍平却用葱白剥去麤皮
十餘根作一縛切作一指厚片安在鹽上用大艾

炷滿蔥餅子大小以火灸之覺熱氣直入腹中即時便通神驗不可具述

療產後小便不通

用陳皮一兩去白為末空心溫酒調二錢一服便通

治產後小便不利心腹脹滿

出朱氏集驗方

蔥白

五寸

燈心

麥門冬

各少許

荊芥

七穗

薑

五片

右咬咀水盞半煎一盞不拘時非時發熱變成風氣

致手足抽動用金銀耳環并薑棗煎溫服傷寒鼻塞
用蔥白五寸煎服

治產後小便不通

出聖
惠方

用蔥搗爛蜜調以紙花貼臍下

淋瀝

附論

產後諸淋因產有熱氣客於脬中內虛則起數熱則小便澀痛故謂之淋 治諸產前產後淋秘其法不同產前當安胎產後當去血如其冷熱膏石氣淋等為治則

一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃最為產後要藥唯當尋其所因則不失機要

方

茅根湯

出三因方

治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之

白茅根

八兩

瞿麥穗

白茯苓

各四兩

葵子

人參

各二兩

蒲黃

桃膠

滑石

甘草

各一兩

石首魚頭中石

二十箇燒

紫貝

十箇燒

右為散每服四錢水一盞半薑三片燈心二十根煎

至七分去滓溫服亦可為末木通湯調下二錢如氣

壅閉不通橘皮煎湯調服

當歸散

出聖惠方

治產後卒淋瀝小腹疼痛

當歸

牛兩剉炒

生乾地黄

三分

石韋

牛兩去毛

梔子仁

牛兩

赤芍藥

牛兩

赤茯苓

三分

王不留行

牛兩

瞿麥

三分

麥門冬

三分

木香

三分

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三

四服

石韋湯

出千金方

治產後卒淋氣淋血淋石淋

石韋 黃芩

通草

甘草

各二兩

榆皮

五兩

大棗

三十枚

葵子

二升

白朮

產實用
均藥

生薑

各三兩

右咬咀以水八升煮取一升半分三服集驗無甘草

生薑崔氏同產寶不用薑棗

葵根湯

出千金方

治產後淋瀝

葵根

二兩

車前子

一升

亂髮

燒灰

大黃

桂心

滑石

各一兩

通草

三兩

生薑

六兩

冬瓜練

七合

一作汁

右咬咀以水七升煮取二升半分三服千金翼不用

冬瓜練一方云既有大黃亦可治大便不通故錄如
此更宜斟酌量虛實而投之

茅根湯

出千金方

治產後淋瀝

白茅根

一斤

瞿麥

茯苓

各四兩

地脉

人參

各二兩

生薑

三兩

桃膠

甘草

各一兩

鯉魚齒

一百枚

右咬咀以水十升煮取二升半分三服

黃芩散

出聖惠方

治產後小腸結熱淋瀝心神煩躁口舌乾

焦不思飲食

黃芩

半兩

瞿麥

甘草

炙

麥門冬

去心各半兩

滑石

木通

車前子

葵子

各一兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

葵子散

出聖惠方

治產後小腸風氣隔閉淋瀝不通

葵子

一兩

滑石

三分

黃芩

三分

瞿麥

三分

燈心

一分

白石英粉

一兩

防葵

半兩

甘草

炙一分

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三

四服

療產後患淋小便不通此氣虛挾熱產前當安胎產後

當思逐血

出永類
鈴方

通草

三

大棗

三十
枚

葵子

一

白朮

一

榆白皮

五

石韋

黃芩

各二
兩

右以水八升煎取二升半空心溫服呷千金有甘草

生薑

療產後小便痛及血淋

出聖
惠方

白茅根

五

瞿麥

二

車前子

二

冬葵子

二

鯉魚齒

十

齒末

通草 三兩

右水二升煮取一升入茵末空心服

葵根散

出聖惠方

治產後小便淋瀝臍下妨悶

冬葵根

一兩

車前子

三分

滑石

一兩

冬瓜仁

三分

木通

剉一兩

川大黃

三分

桂心

一分

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三

四服

療產後卒患淋小便礮痛及至尿血

冬葵子

升一

通草

兩三

石韋

去毛

兩三

滑石末

別研

茯苓

兩二

黃芩

兩二

右水九升煮取三升入滑石末空心服忌熱麪醋物

螬蛸散

出便產須知

治產後房勞舉重能令發作清水續續

小便淋露不止

海螬蛸

枯礬

五倍子

各等分

右為末研桃仁拌勻傳之

鯉魚齒湯

出便產須知

治產後淋痛及血淋

鯉魚齒

一百二十箇

葵子

三合 黃芩

五錢

瞿麥

二錢

車前子

二錢

木通

二錢

右水二升煎取一升入齒末空心日三服

滑石散

出聖惠方

治產後小便淋瀝心神煩悶

滑石

一斤

木通

一斤

車前子

一斤

葵子

三分

黃芩

三分

麥門冬

去心三分

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓溫服日

三四服

療產後小便澀痛或血淋者

瞿麥

黃芩

冬葵子

各二兩

通草

三兩

大棗

十一枚

右以水七升煮取二升半分作兩服

大麻仁散

出聖惠方

治產後小便淋瀝疼痛

大麻仁

一兩

榆白皮

一兩剉

葵子

一兩

瞿麥

半兩

甘草

一分炙剉

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

滑石散

治產後淋

滑石

五兩

通草

車前子

葵子

各四兩

右治下篩酢漿水服方寸匕稍加至二

療產後血淋

車前子

瞿麥

各四兩

黃芩

三兩

麝香金末

一兩

右以水六升煮取二升下麝香金末分三服

瞿麥湯 治產後淋痛因虛損有熱氣客於胞中血隨

小便出為血淋淋者如雨之淋者也內虛則起數內

熱則小便澀痛乃曰淋

瞿麥

黃芩

通草

各半兩

大棗

十二枚

右以水一盞半藥四味每四錢煎至大半盞去滓服

治產後小便淋不通七八日

滑石

六錢

葵子

三錢

寒水石

四錢

右為散每服三錢水一盞半煎至大半盞空心服

治產後小便淋瀝不通

葵子

一合

朴硝

八分

右水二升煮取八合下硝分四服

又方熨法

用蛇床子炒乘熱布裹之熨患處亦治陰痛

治產後小便淋瀝腹脇脹滿時復疼痛

用鼠婦半兩炒為末每服半錢溫酒調下

治產後小便血

附論

夫產後損於血氣虛而挾於熱血氣得熱則流散滲於
腠故血隨小便出也

方

石韋散

治產後臟有積熱致小便出血

石韋

去毛
三兩

榆白皮

剉
三兩

黃芩

二兩

木通

剉
二兩

赤芍藥

二兩

冬葵子

二兩

甘草

二兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

一方無甘草

茜根散 治產後小便出血

茜根

一兩

石韋

去毛
二兩

木通

剉
二兩

子芩

一兩

生乾地黃

一兩

滑石

二兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

又方

瞿麥

一兩

黃芩

冬葵子

木通

剉

茜根

當歸

各一兩

右為末每服四錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

又方

貝齒

五枚
燒灰

葵子

一兩

車前子

一兩

滑石

二兩

生乾地黄

一兩

茜根

一兩

右為末每服二錢食前溫水調下

又方

車前子

二兩

瞿麥

黃芩

爵金

蒲黃

各一兩

右為末每服二錢茅根湯食前調下

又方 治產後小便出血

亂髮灰

洗淨
燒

滑石

各半
兩

右為末令勻每服一錢生地黄汁調下一方無滑石
米飲調下

又方

生地黄

生刺薊

各半
斤

右搗絞汁每服一小盞食前米飲下

又方

生乾地黄

阿膠

搗炒各一兩

右為末每服二錢食前茜根湯調下

小便頻數不禁

附論

夫產後小便頻數不禁者此由脬內宿有冷氣因產後發動冷氣入腹虛弱不能制其小便故也

方

雞臍脰湯

治產後小便頻

雞肫脰

二具三

雞腸

三具洗

乾地黄

當歸

甘草

各二兩

麻黃

四兩

厚朴

人參

各三兩

生薑

五兩

大棗

二十枚

右咬咀水一斗煮肫脰及腸大棗取七升去滓內諸

藥煎取三升半分三服

鹿茸散

出聖惠方

治產後臟虛小便數多

鹿茸

一兩去毛塗酥炙

黃耆

剉一兩半

牡蠣

一兩半燒為末

人參

一兩去蘆頭

熟乾地黄

二兩

當歸

剉炒一兩

五味子

一兩

雞肫脰

炙一兩半

甘草

炙剉半兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

桔萸湯

出千金方

治產後小便數兼渴

桔萸根

麥門冬

甘草

黃連

各二兩

人參

三兩

生薑

三兩

桑螵蛸

二十枚

大棗

十五枚

右以水七升煮取二升半分三服一方無麥門冬忌豬肉冷水

桑螵蛸散

出聖惠方

治產後小便數此胞有宿冷冷氣又入

腹中虛弱不能制其小便故數有遺尿者冷在胞囊

漏不禁也

桑螵蛸

三十箇 燒

鹿茸

酥炙

黃耆

各三兩

牡蠣

煨

人參

厚朴

赤石脂

各二兩

右為末空心粥飲調下二錢外臺無厚朴石脂有甘

草生薑不禁加龍骨

龍骨散

出聖惠方

治產後小便數多

龍骨

一兩 牡蠣

一兩 燒為粉

桂心

半兩

烏藥

一兩

桑螵蛸

炒半兩

煖藥

剉一兩

熟乾地黄

一兩半

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六

分食前溫服

又方

出聖惠方

雞肫胗

十具炙

熟乾地黄

半兩

當歸

剉炒半兩

牡蠣

一兩燒為粉

厚朴

三分去麁皮塗生薑汁炙

黃耆

剉一兩

右為末每服二錢食前溫酒調下

又方

出聖惠方

黃耆

剉一兩

鹿茸

一兩去毛塗酥炙

桑螵蛸

一兩剉

牡蠣

一兩燒為粉

雞臍脰

一兩
微剉

右為末每服二錢食前粥飲調下

麥門冬散

出聖
惠方

治產後小便數兼煩渴

麥門冬

去心
三分

龍骨

三分

當歸

三分
剉微炒

黃耆

三分
剉

甘草

一分
炙剉

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至五

分去滓食前溫服

又方

出聖
惠方

桑螵蛸

半兩
炒

龍骨

右為細末每服二錢空心食前粥飲調下

療產後遺尿不知出

出便產
頻知

白薇 芍藥

右等分為細末以酒服方寸匕日服三

療產後小便不禁

出聖
惠方

用雞尾燒作灰細研溫酒調方寸匕日三

固腠散

出楊氏
家藏方

治婦人臨產時傷手胞破小便不禁

用黃絲絹自然黃者不用染成三尺以灰汁煮極

化爛用清水洗去灰令淨入黃臘半兩蜜一兩白
茅根二錢馬尾勃末二錢以水一升再煎至一盞
空心頓服服時欬氣服之不得作聲如作聲無效

治產後遺尿

用故雞窠中草燒作末酒服二錢立瘥

治產後小便不禁

出肘
後方

用雞屎燒灰空心酒服方寸匕

治產後小便不禁

用雞子燒灰酒服日三

療產後小便不記度數小腸虛損方

出護命方

當歸 五味子 石斛 牛膝 牡蠣

火燉各半兩

萆薢 白芷

各三分

龍骨

一分

益智子

去皮一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下四十丸病減即住只作散子喫不喫滓

補腴飲

出危氏方

治婦人產後傷胞動破終日不能小便但

漏濕不乾

黃絲絹

生者一尺剪碎

白牡丹皮末


千葉者它無効

白及末

一錢

右用水一碗煎至絹爛如飴室心頓服服時不得作

聲作聲不效



普濟方卷三百五十四